



02009152707000008



12505

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 915

27 Ιουλίου 2000

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 470

Περιοχές προώθησης δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2000 στο χώρο δικαιοδοσίας της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Νομοί: Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4035/1960 «Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών».
2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 733/1964 «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας».
3. Την απόφαση 3189/3.5.1999 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Περί μεταβιβάσεως δικαιώματος υπογραφής Με Εντολή Γενικού Γραμματέα στον Προϊστάμενο της Δ.Γ.Α.».
4. Την 347195/10.4.2000 απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Καθορισμός προωθούμενων ειδών, ποικιλιών και λοιπών δραστηριοτήτων δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2000».
5. Τον Ν. 2503/1997 «Οργάνωση - Διοίκηση - Στελέχωση της Περιφέρειας και λοιπές διατάξεις».
6. Σχετική εισήγηση του Τμήματος Γεωργικής Ανάπτυξης της Υπηρεσίας μας ύστερα από συνεννόηση με τις κατά τόπους Δ/σεις Γεωργίας.
7. Το γεγονός, ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις περιοχές προώθησης δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2000 στο χώρο των Δ/σεων Γεωργίας της περιοχής ευθύνης μας, ως ακολούθως.

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Μόνο σε περιοχές του νομού όπου δεν έχουν εμφανιστεί προσβολές από βακτηριακό κάψιμο σε μηλοειδή ή φυτά ξενιστές της αυτοφυούς βλάστησης.

1. Αχλαδιά

Οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9), οι οποίες παρουσάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες αχλαδιάς. Προωθούνται σε πεδινές περιοχές κατάλληλες για την καλλιέργεια της αχλαδιάς και εφόσον η Δ/ση Γεωργίας μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας κρίνουν, ότι μπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια της αχλαδιάς στα τοπικά γεωργικά προγράμματα τους.

2. Nashi

Προωθείται σε περιοχές κυρίως πεδινές και εφόσον η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας κρίνουν, ότι μπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια στα τοπικά γεωργικά προγράμματα τους.

Β. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1. Φυστικιά

Η ποικιλία Αιγίνης σε όλες τις περιοχές του νομού

2. Καρυδιά

Βασικά οι ποικιλίες

- GUSTINE (πλαγιόκλαδη, πρώιμης βλάστησης) με επικονιαστή είτε την AMIGO είτε την PEDRO.
- VINA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους ως ανωτέρω επικονιαστές.
- CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.
- HARTLEY (με πολύ μικρή πλαγιοκαρπία, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή την FRANQUETTE.
- FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) και με επικονιαστές είτε την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.

Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%.

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Βατόμουρα - Σμέουρα

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS και URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδικές μορφές τους στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού.

Η Δ/ση Γεωργίας θα αποφασίζει με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των περιοχών και μόνο εφόσον κρίνουν, ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων τους.

2. Κυδωνιά - Ροδιά - Λωτός

Ποικιλίες, που δοκιμάστηκαν στις τοπικές συνθήκες και κρίθηκαν κατάλληλες από την Δ/ση Γεωργίας και το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας.

Δ. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

1. Πεκάν

Με τις ποικιλίες PAWNE, CHOCTAW, WESTERN, DESIRABLE και DELMAS (η ανωτέρω καλλιέργεια αντέχει και σε μη θερμά κλίματα).

Ε. ΕΛΙΑ

Επεκτείνονται νέες φυτεύσεις ελαιοδένδρων σε έκταση 850 στρ. στο νομό εκτός του Κωπαϊδικού πεδίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 342155/ 16.03.2000 εγκυκλίου της Δ/σης ΠΑΠ Δεν/κης του Υπ. Γεωργίας.

II. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Στα αμπελοειδή προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες στο νομό, οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν. ΕΟΚ 3800/81 με τις τροποποιήσεις του, καθώς επίσης και οι επιτρεπόμενες εκείνες, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης Τοπικών οίνων. Σημειώνεται, ότι επέκταση της καλλιέργειας επιτρέπεται μόνο κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς (ΕΚ) και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.

III. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες αυτών:

1. Τομάτα υπό κάλυψη

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική αγορά. Από αυτά προτιμούνται τα παρακάτω υβρίδια και ποικιλίες: CORTINA, ERNESTO, NAESICA, IRON, INDALO, BIZON-F1-1255, JAMBO-F1, MANTHOS, NOA, κ.τ.λ.

2. Αγγούρι υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια, που έχουν δοκιμαστεί και ευδοκίμουν στο νομό όπως τα CADOR, VENUS, VIRGINIA 722, BAMBINA, SANDRA, κ.τ.λ.

3. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονειδίων, φασολάκια και κολοκυθιών.

4. Φράουλα υπό κάλυψη

Οι ποικιλίες USO GRANDE, DOUGLAS, κ.τ.λ.

5. Τομάτα στην ύπαιθρο

Οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη και οι ποικιλίες ERATO FI, CORBI FI, GALLI, κτλ, εφόσον εφαρμόζεται ειδικά καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή την οψίμηση της παραγωγής.

6. Σπαράγγια στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις κατάλληλες προσφερόμενες για τον σκοπό αυτό αμώδεις περιοχές του νομού.

7. Φράουλα στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες φράουλας και ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση φράουλας υπό κάλυψη στις κατάλληλες προσφερόμενες περιοχές του νομού.

8. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση

Αγγινάρες, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, μπάμια και αγγουράκι στις κατάλληλες περιοχές του νομού.

9. Μανιτάρια

Τα καλλιεργούμενα μανιτάρια βασιδιομυκήτων των ειδών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITOROUS, PLEUROTUS SP κ.τ.λ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας και η οποία αφορά α) την καταλληλότητα του φορέα και β) την καταλληλότητα της προσφερόμενης τοποθεσίας που πρόκειται να γίνει η καλλιέργεια.

10. Γενικά

Για όλα τα κηπευτικά εκτός της πατάτας προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια, στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

IV. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ**A. ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ****α) Κομμένα λουλούδια**

Γαρίφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ζέρμπερες, στρελίζιες, ορχιδέες, βολβοειδή, κ.τ.λ.

β) Κομμένα φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλλωμάτων

γ) Γλαστρικά

Γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος, κ.τ.λ.

δ) Πολλαπλασιαστικό υλικό**B. ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ**

Όλες οι ποικιλίες που αναφέρονται παραπάνω φυτεύονται σε πυκνή φύτευση στα υποκείμενα M9, M26, MM 111 και MM 106 στις ορεινές περιοχές του νομού. Οι κλώνοι τύπου SPUR εμβολιάζονται μόνο στα ημινάνα υποκείμενα MM 106, MM 111 εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπου δημιουργούνται προβλή-

ματα καλής στήριξης των δένδρων από χιονοπτώσεις, οπότε κρίνεται σκόπιμη και η χρησιμοποίηση σποροφύτων.

2. Αχλαδιά

Οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΙΑΝΝΙΔΗ 2/9), οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες. Προωθούνται σε περιοχές κυρίως πεδινές κατάλληλες για την καλλιέργεια της αχλαδιάς και εφόσον η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας κρίνουν, ότι μπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια της αχλαδιάς στα τοπικά γεωργικά προγράμματα τους.

3. Nashi

Πρόκειται για ένα καινούργιο είδος που ευδοκίμει στην Ελλάδα. Προωθείται σε περιοχές κυρίως πεδινές και εφόσον η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας κρίνουν, ότι μπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια στα τοπικά γεωργικά προγράμματα τους.

Δ. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ**1. Βερικοκιά**

Σε περιοχές κατά το δυνατόν μειωμένου κινδύνου μόλυνσης από την ίωση SHARKA με δενδρύλια από φυτώρια, που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων.

Η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ σε ξηροθερμικές περιοχές με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο άνθησης και μόνο ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. Κερασιά

Οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN, VOGUE καθώς και η όψιμη και μεγαλόκαρπη ποικιλία GERMERDORFER με τους κατάλληλους επικονιαστές τους στις κατάλληλες περιοχές του νομού και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε περιοχές όπου κατά την περίοδο της ανθοφορίας επικρατούν ιδιόζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, κτλ) προτείνεται η χρησιμοποίηση της αυτογόνιμης ποικιλίας STELLA.

3. Δαμασκηλιά

Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση υγιούς φυτωριακού υλικού απαλλαγμένου από ιώσεις και ιδιαίτερα της SHARKA και επιπλέον για τις ιαπωνικού τύπου δαμασκηνίες και από τα μυκοπλάσματα.

α) Επιτραπέζια:

- Οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες PRESIDENT και STANLEY, που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA στις κατάλληλες περιοχές του νομού.
- Οι ιαπωνικές ποικιλίες είναι όλες σχεδόν αυτόστειρες, γι' αυτό πρέπει να συνοδεύονται από τον επικονιαστή τους. Επιπλέον ανθίζουν από τις αρχές Μαρτίου, γι' αυτό πρέπει να αποφεύγεται η φύτευση, όπου έχουμε όψιμους ανοιξιότικους παγετούς.

1. Πορτοκαλιά

α) Οι πρώιμες ποικιλίες Navel New Hall, Navelina και Salustiana

β) Η όψιμη ποικιλία Lane Late επί των υποκειμένων:

- τριφύλλη πορτοκαλιά και Citranges για συγκομιδή της παραγωγής τον Φεβρουάριο μήνα,
- νερατζιά για συγκομιδή της παραγωγής τον μήνα Μάρτιο,
- C. Volkameriana για συγκομιδή της παραγωγής τους μήνες Απρίλιο και Μάιο,
- C. Macrophylla για συγκομιδή της παραγωγής τον μήνα Ιούνιο και μετά.

2. Λεμονιά

α) Η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ σε όλες τις ζώνες λεμονοκαλλιέργειας του νομού απηλλαγμένων παγετών για την αύξηση της εκτός συνήθους εποχής παραγωγής λεμονιών (θερινά λεμόνια) με την διαφοροποίηση των καλλιεργητικών εργασιών και φροντίδων (υδατική καταπόνηση, κτλ)

β) Η πολύφορη ποικιλία EUREKA μόνο επί του υποκειμένου BENTON CITRANGE σε μη παγετόπληκτες περιοχές, που είναι αμόλυντες από την ασθένεια «Κορυφοξήρα».

3. Μανταρινοειδή

α) Η Κλημεντίνη και ιδιαίτερα οι κλώνοι της MARISOL, CLEMENPONS, ARRUFANTINA, SRA 63, Πόρου και το μανταρινοειδές NOVA στις κατάλληλες περιοχές του νομού.

β) Η μεσο-όψιμη Κλημεντίνη HERNANDINA στις απαλλαγμένες παγετού κατάλληλες περιοχές του νομού.

γ) Τα μανταρινοειδή FORTUNE και ORTANIQUE με προτίμηση τον κλώνο MANDORAS στις απαλλαγμένες παγετού κατάλληλες περιοχές του νομού

Β. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

1. Φραγκοσυκιά

Οι ποικιλίες XAI, PE1, KA2 και P02 στις θερμότερες, υπήνεμες και ξηρικές περιοχές του νομού.

2. Πεκάν

Με τις ποικιλίες PAWNE, CHOCTAW, WESTERN, DESIRALE και DELMAS (η ανωτέρω καλλιέργεια αντέχει και σε μη θερμά κλίματα).

Γ. ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Μόνο σε περιοχές του νομού όπου δεν έχουν εμφανιστεί προσβολές από βακτηριακό κάψιμο σε μηλοειδή ή φυτά ξενιστές της αυτοφυούς βλάστησης.

1. Μηλιά

α) Από την ομάδα RED DELICIOUS οι κλώνοι TOPRED, RED-CHIEF, OREGON SPUR και STARKRIMSON (τύπος SPUR)

β) Από την ομάδα GOLDEN DELICIOUS οι κλώνοι SMOOTHIE, GOLDEN B.

γ) Από τις τριπλοειδείς ποικιλίες, οι ποικιλίες JONAGOLD, JONAGORED με την πρόβλεψη να μπουν απαραίτητα δύο διπλοειδείς ποικιλίες για κανονική γονιμοποίηση.

δ) Από τις πρώιμες ποικιλίες η ποικιλία GALA και ειδικά οι κόκκινες μεταλλαγές της.

ε) Από τις ανθεκτικές στο φουζικλάδιο ποικιλίες η FLORINA (GUERINA) ενδείκνυται κυρίως για ορεινές και υγρές περιοχές.

Σε τοποθεσίες του νομού με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας) από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο.

α) **Κομμένα λουλούδια:** Γαρύφαλλα, βολβοειδή, κτλ

β) **Κομμένα φυλλώματα:** Όλα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλλωμάτων

γ) **Γλαστρικά:** Γαρδένια, Καμέλια, κτλ.

δ) **Φυτά κηποτεχνίας:** Όλα τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον του νομού.

Υ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται:

α) Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους σε όλες τις κατάλληλες περιοχές του νομού και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

β) Ο εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήματα άρδευσης πάσης φύσεως, μηχανήματα και συστήματα για την φυτοπροστασία, συστήματα αφαλάτωσης νερού και άλλα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπ. Γεωργίας.

γ) Τα συστήματα εκμετάλλευσης θερμικών απωλειών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Για την καλλιέργεια του σπαραγγιού προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας:

- πολλαπλασιαστικό υλικό
- έγχειρες βελτιώσεις
- συστήματα άρδευσης
- μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια σπαραγγιού

- συστήματα άρδευσης για πρωίμηση της παραγωγής.

3. Για τις καλλιέργειες μανταρινών προωθείται η εγκατάσταση, ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργία μονάδων παραγωγής μανταρινών οικογενειακής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη Γεωργική εκμετάλλευση θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

4. Για την καλλιέργεια της ανοιξιάτικης πατάτας προωθείται η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας στις πρώιμες περιοχές του νομού.

5. Προωθούνται οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων - ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη.

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Χρησιμοποιούμενο βασικό υποκείμενο η Νεραντζιά αλλά και οποιαδήποτε από α) Τρίφυλλη Πορτοκαλιά (Poncims trifoliata), β) Troyer citrange, γ) Carrizo citrange και δ) Citrmelo για τα γλυκόχυμα εσπεριδοειδή γενικά και μετά από έλεγχο του ασβεστίου στο έδαφος, ώστε το μεν ολικό να μην ξεπερνά το 20%, το δε ενεργό το 4% για την τρίφυλλη πορτοκαλιά και το 7% για τα υπόλοιπα. Ομοίως για τη λεμονιά, τη νεραντζιά αλλά και τη C. Volkameriana και η C. Macrophylla γενικά. Για μετατροπές (επανεμβολιασμό, εκρίζωση και επαναφύτευση) φυτειών εσπεριδοειδών αποθαρρυνόμενων - ως εμπορικά ανεπιθύμητων - ποικιλιών, στις εσπεριδο-παραγωγικές περιοχές του νομού προωθούνται κατ' είδος οι παρακάτω ποικιλίες/κλώνοι:

• Οι ποικιλίες SANTA ROSA και LATE SANTA ROSA με επικονιαστή την ELEPHANT HEART στις πρώιμες περιοχές του νομού.

Οι ποικιλίες:

• GALITA	με επικονιαστή	την SANTA ROSA ή την LARODA
• LARODA	«	SANTA ROSA
• BLACK STAR	«	SANTA ROSA & BLACK GOLD
• BLACK GOLD	«	ANGELENO, BLACK DIAMOND, BLACK GOLD
• BLACK DIAMOND	«	ANGELENO, BLACK GOLD, FRIAR
• FRIAR	«	SANTA ROSA, LARODA
• BLACK AMBER	«	SANTA ROSA, FRIAR
• ANGELENO	«	BLACK GOLD, SIMGA

στις κατάλληλες περιοχές του νομού σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

β) Αποξηραινόμενα

Η ποικιλία ΣΚΟΠΕΛΟΥ (AGEN) ή PRUNE D' ENTE 707 με επικονιαστή την ποικιλία STANLEY στις κατάλληλες περιοχές της χώρας.

4. Ροδακινιά

Προωθείται μόνο σε περιοχές, όπου παράγεται προϊόν που έχει εγκριθεί ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. στα πλαίσια του Καν. (ΕΚ) 2081/1992.

Ε. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1. Φυστικιά

Η ποικιλία Αιγίνης σε κατάλληλες τοποθεσίες του νομού.

2. Καρυδιά

Βασικά οι ποικιλίες:

- GUSTINE (πλαγιόκλαδη, πρώιμης βλάστησης) με επικονιαστή είτε την AMIGO είτε την PEDRO.
- VINA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους ως ανωτέρω επικονιαστές.
- CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο ταυ-

τόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLAN-NAISE.

- HARTLEY (με πολύ μικρή πλαγιοκαρπία, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή την FRANQUETTE.
- FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) και με επικονιαστές είτε την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.

Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%.

3. Καστανιά

Κάθε ποικιλία, η οποία αποδεδειγμένα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και τις οδηγίες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν παρουσιάζει πρόβλημα προσβολής από τον μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

ΣΤ. ΕΛΙΑ

Επεκτείνονται νέες φυτεύσεις ελαιοδένδρων σε έκταση 1700 στρ. στο νομό σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 342155/16.03.2000 εγκυκλίου της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του Υπ. Γεωργίας.

2. ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1. Συκιά

- Παραγωγή Ξηρών σύκων.

Οι ποικιλίες Κύμης και Καλαματιανή στις κατάλληλες περιοχές του νομού

- Παραγωγή νωπών σύκων.

Οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και κρίνονται από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.

2. Λωτός

Στις κατάλληλες περιοχές του νομού με κάθε ποικιλία, που δοκιμάστηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ή που προτείνεται από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας. Ιδιαίτερως οι ιαπωνικές ποικιλίες, οι οποίες στερούνται στοιφότητας του καρπού (non-astrigent).

3. Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS & URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδικές μορφές τους στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού.

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης θα αποφασίσει με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των περιοχών και μόνο εφόσον κρίνουν, ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων τους.

II. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Στα αμπελοειδή προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες στο νομό, οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κανονισμούς Κανονισμούς όπως Καν. (ΕΟΚ) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του, καθώς επίσης και οι επιτρεπόμενες εκείνες, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης Τοπικών οίνων. Σημειώνεται, ότι επέκταση της καλλιέργειας επιτρέπεται μόνο κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς (ΕΚ) και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.

III. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες αυτών:

1. Τομάτα υπό κάλυψη

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική αγορά. Από αυτά προτιμούνται τα παρακάτω υβρίδια και ποικιλίες: CORTINA, ERNESTO, NAESICA, IRON, INDALO, BIZON-F1-1255, JAMBO-F1, MANTHOS, NOA, κ.τ.λ.

2. Αγγούρι υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια, που έχουν δοκιμαστεί και ευδοκούν στο νομό όπως τα CADOR, VENUS, VIRGINIA 722, BAMBINA, SANDRA, κ.τ.λ.

3. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονειδών, φασολάκια και κολοκυθιών.

4. Φράουλα υπό κάλυψη

Οι ποικιλίες USO GRANDE, DOUGLAS, κ.τ.λ.

5. Τομάτα στην ύπαιθρο

Οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη και οι ποικιλίες ERATO FI, CQRBI FI, GALLI, κτλ, εφόσον εφαρμόζεται ειδικά καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή την οψίμηση της παραγωγής.

6. Σπαράγγια στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις κατάλληλες προσφερόμενες για τον σκοπό αυτό αμμώδεις περιοχές του νομού.

7. Φράουλα στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες φράουλας και ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση φράουλας υπό κάλυψη στις κατάλληλες προσφερόμενες περιοχές του νομού.

8. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση

Αγγινάρες, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, μπάμια και αγγουράκι στις κατάλληλες περιοχές του νομού.

9. Μανιτάρια

Τα καλλιεργούμενα μανιτάρια βασιδιομυκήτων των ειδών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITOROUS, PLEUROTUS SP κ.τ.λ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας και η οποία αφορά α) την καταλληλότητα του φορέα και β) την καταλληλότητα της προσφερόμενης τοποθεσίας που πρόκειται να γίνει η καλλιέργεια.

10. Γενικά

Για όλα τα κηπευτικά εκτός της πατάτας προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια, στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

IV. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

A. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

α) Κομμένα λουλούδια

Γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ζέρμπερες, στρελίζιες, ορχιδέες, βολβοειδή, κ.τ.λ.

β) Κομμένα φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλλωμάτων

γ) Γλαστρικά

Γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος, κ.τ.λ.

δ) Πολλαπλασιαστικό υλικό

B. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Σε τοποθεσίες του νομού με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας) από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο.

α) Κομμένα λουλούδια: Γαρύφαλλα, βολβοειδή, κτλ

β) Κομμένα φυλλώματα: Όλα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλλωμάτων

γ) Γλαστρικά: Γαρδένια, Καμέλια, κτλ.

δ) Φυτά κηποτεχνίας: Όλα τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον του νομού.

V. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται:

α) Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους σε όλες τις κατάλληλες περιοχές του νομού και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

β) Ο εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήματα άρδευσης πάσης φύσεως, μηχανήματα και συστήματα για την φυτοπροστασία, συστήματα αφαλάτωσης νερού και άλλα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπ. Γεωργίας.

γ) Τα συστήματα εκμετάλλευσης θερμικών απωλειών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Για την καλλιέργεια του σπαραγγιού προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας:

- πολλαπλασιαστικό υλικό

- έγχειες βελτιώσεις
- συστήματα άρδευσης
- μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια σπαραγγιού
- συστήματα άρδευσης για πρωίμηση της παραγωγής.

3. Για τις καλλιέργειες μανιταριών προωθείται η εγκατάσταση, εκσυγχρονισμός και λειτουργία μονάδων παραγωγής μανιταριών οικογενειακής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη Γεωργική εκμετάλλευση θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

4. Για την καλλιέργεια της ανοιξιάτικης πατάτας προωθείται η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας στις πρώιμες περιοχές του νομού.

5. Προωθούνται οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων - ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη.

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Μόνο σε περιοχές του νομού όπου δεν έχουν εμφανιστεί προσβολές από βακτηριακό κάψιμο σε μηλοειδή ή φυτά ξενιστές της αυτοφυούς βλάστησης.

1. Μηλιά

α) Από την ομάδα RED DELICIOUS οι κλώνοι TOPPED, RED-CHIEF, OREGON SPUR και STARKRIMSON (τύπος SPUR)

β) Από την ομάδα GOLDEN DELICIOUS οι κλώνοι SMOOTHIE, GOLDEN B.

γ) Από τις τριπλοειδείς ποικιλίες, οι ποικιλίες JONAGOLD, JONAGORED με την πρόβλεψη να μπουν απαραίτητα δύο διπλοειδείς ποικιλίες για κανονική γονιμοποίηση.

δ) Από τις ανθεκτικές στο φουζικλάδιο ποικιλίες η FLORINA (GUERINA) ενδείκνυται κυρίως για ορεινές και υγρές περιοχές και όπου προβλέπεται εφαρμογή ολοκληρωμένης παραγωγής μήλων.

Οι κλώνοι τύπου SPUR εμβολιάζονται μόνο στα ημιάννα υποκείμενα MM 106, MM111 εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπου δημιουργούνται προβλήματα καλής στήριξης των δένδρων από χιονοπτώσεις, οπότε κρίνεται σκόπιμη και η χρησιμοποίηση σποροφύτων.

Β. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Ι. Κερασιά

Οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ και η όψιμη μεγαλόκαρπη ποικιλία GERMERSDORFER με τους κατάλληλους επικονιαστές στις κατάλληλες περιοχές του νομού κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

Σε περιοχές όπου κατά την περίοδο της ανθοφορίας επικρατούν ιδιόζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, κ.τ.λ.) προτείνεται η χρησιμοποίηση της αυτογόνιμης ποικιλίας STELLA.

Γ. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1. Καρυδιά

Η ποικιλία FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) και με επικονιαστές είτε την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE. Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%. Δευτερευόντως κάθε άλλη ποικιλία, η οποία αποδεδειγμένα κρίνεται από την αρμόδια Δ/νση Γεωργίας κατάλληλη για μια δεδομένη περιοχή.

2. Καστανιά

Κάθε ποικιλία, η οποία κρίνεται από την αρμόδια Δ/νση Γεωργίας σαν κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής και δεν παρουσιάζει πρόβλημα προσβολής από τον μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

ΙΙ. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Στα αμπελοειδή προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες στο νομό, οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν. (ΕΟΚ) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του, καθώς επίσης και οι επιτρεπόμενες εκείνες, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται

στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης Τοπικών οίνων. Σημειώνεται, ότι επέκταση της καλλιέργειας επιτρέπεται μόνο κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς (ΕΚ) και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1. Φυστίκι

Η ποικιλία Αιγίνης στις κατάλληλες περιοχές του νομού ύστερα από εξέταση των εδαφοκλιματικών συνθηκών κάθε περιοχής και έγκριση από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. Καρυδιά

Βασικά οι ποικιλίες:

- GUSTINE (πλαγιόκλαδη, πρώιμης βλάστησης) με επικονιαστή είτε την AMIGO είτε την PEDRO.
- VINA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους ως ανωτέρω επικονιαστές.
- CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.
- HARTLEY (με πολύ μικρή πλαγιόκαρπια, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή την FRANQUETTE.
- FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) και με επικονιαστές είτε την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.

Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%.

Δευτερευόντως κάθε άλλη ποικιλία η οποία αποδεδειγμένα κρίνεται από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης κατάλληλη για μια δεδομένη περιοχή.

3. Καστανιά

Κάθε ποικιλία, η οποία κρίνεται από την αρμόδια Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης σαν κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής και η οποία δεν παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα στον μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

Β. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

1. Ακτινίδια

Η ποικιλία ακτινιδιάς HOWARD και ιδιαίτερα η επιλογή CHICO με την κατάλληλη σχέση και χωροταξική εγκατάσταση των επικονιαστών της (άρρενα) στις κατάλληλες τοποθεσίες του νομού και σε έκταση 400 στρ.

2. Πεκάν

Με τις ποικιλίες PAWNE, CHOCTAW, WESTERN, DESIRABLE και DELMAS (η ανωτέρω καλλιέργεια αντέχει και σε μη θερμά κλίματα).

Γ. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1. Κερασιά

Οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN, VOGUE καθώς και η όψιμη και μεγαλόκαρπη ποικιλία GERMERSDORFER με τους κατάλληλους επικονιαστές τους στις κατάλληλες περιοχές του νομού και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε περιοχές όπου κατά την περίοδο της ανθοφορίας επικρατούν ιδιόζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, κ.τ.λ.) προτείνεται η χρησιμοποίηση της αυτογόνιμης ποικιλίας STELLA.

2. Δαμασκηλιά επιτραπέζια

α. Οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες PRESIDENT και STANLEY, που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA στις κατάλληλες περιοχές του νομού.

β. Οι ιαπωνικές ποικιλίες είναι όλες σχεδόν αυτόστειρες, γι' αυτό πρέπει να συνοδεύονται από τον επικονιαστή τους. Επιπλέον ανθίζουν από τις αρχές Μαρτίου, γι' αυτό πρέπει να αποφεύγεται η φύτευση, όπου έχουμε όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρησιμοποίηση υγιούς φυτωριακού υλικού απαλλαγμένου από ιώσεις, ιδιαίτερα δε την ίωση SHARKA.

3. Βερικοκιά

Η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ σε ξηροθερμικές περιοχές με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο άνθησης και μόνο ύστερα από έγκριση της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης.

4. Ροδακινιά

Προωθείται μόνο σε περιοχές, όπου παράγεται προϊόν που έχει εγκριθεί ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. στα πλαίσια του Καν. (ΕΚ) 2081/1992.

Δ. ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Μόνο σε περιοχές του νομού όπου δεν έχουν εμφανιστεί προσβολές από βακτηριακό κάψιμο σε μηλοειδή ή φυτά ξενιστές της αυτοφυούς βλάστησης.

1. Αχλαδιά

Οι ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9), οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες αχλαδιάς και προωθούνται σε περιοχές πεδινές κατάλληλες για την καλλιέργεια της αχλαδιάς μετά από την σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης και μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας.

2. Nashi

Προωθείται κυρίως σε πεδινές περιοχές και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας.

Ε. ΕΛΙΑ

Επεκτείνονται νέες φυτεύσεις ελαιοδένδρων σε έκταση 1150 στρ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 342155/16.3.2000 εγκυκλίου της Δ/σης ΠΑΠ Δεν/κης του Υπ. Γεωργίας.

ΣΤ. ΣΥΚΙΑ

Οι ποικιλίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών και κρίνονται από την Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες των περιοχών του νομού.

Ζ. ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ**1. Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα**

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS & URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδικές μορφές τους στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού.

Η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης του νομού θα αποφασίσει με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των περιοχών και μόνο εφόσον κρίνει, ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων τους.

2. Κυδωνιά - Ροδιά - Λωτός

Ποικιλίες, που δοκιμάστηκαν στις τοπικές συνθήκες και κρίθηκαν κατάλληλες από την Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες συνιστώνται από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων δένδρων Νάουσας.

II. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Στα αμπελοειδή προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες στο νομό, οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν. (ΕΟΚ) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του, καθώς επίσης και οι επιτρεπόμενες εκείνες, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης Τοπικών οίνων. Σημειώνεται, ότι επέκταση της καλλιέργειας επιτρέπεται μόνο κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς (ΕΚ) και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.

III. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες αυτών:

1. Τομάτα υπό κάλυψη

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική αγορά. Από αυτά προτιμούνται τα παρακάτω υβρίδια και

ποικιλίες: ROMBO, DOMBITO, A 200, GC 204, ROBIN-JOLLY, KARUZO, BERMUYDA, ALONSO κ.τ.λ. σε όλες τις κατάλληλες περιοχές του νομού.

2. Αγγούρι υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και εκλεκτά υβρίδια αγγουριού, που έχουν δοκιμαστεί και αποδεδειγμένα ευδοκίμουν σε όλες τις περιοχές του νομού και ιδιαίτερα τα BRUNEX, BAMBINA, SANDRA, PEPINEX, KAMARON, VALORE, PALMERA κ.τ.λ.

3. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονοειδών και κολοκυθιών σε όλες τις αποδεδειγμένα κατάλληλες περιοχές.

4. Φράουλα υπό κάλυψη

Οι ποικιλίες TICCA, CORELLA, KRUIZ, TORO, DOUGLAS, AICCO, BRIGHYON, PAJARO, TURPS, FERH κ.τ.λ.

5. Τομάτα στην ύπαιθρο

Οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη, εφόσον εφαρμόζεται ειδικά καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή την οψίμηση της παραγωγής.

6. Σπαράγγια στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις κατάλληλες προσφερόμενες για τον σκοπό αυτό αμμόδεις περιοχές του νομού.

7. Φράουλα στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες φράουλας και ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση φράουλας υπό κάλυψη στις κατάλληλες προσφερόμενες περιοχές του νομού.

8. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση

Αγγινάρες, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, μπάμια και αγγουράκι στις κατάλληλες περιοχές του νομού.

9. Μανιτάρια

Τα καλλιεργούμενα μανιτάρια βασιδιομυκήτων των ειδών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITOROUS, PLEUROTUS SP κ.τ.λ. σε όλες τις περιοχές του νομού και μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης και η οποία αφορά α) την καταλληλότητα του φορέα και β) την καταλληλότητα της προσφερόμενης τοποθεσίας που πρόκειται να γίνει η καλλιέργεια.

10. Γενικά

Για όλα τα κηπευτικά εκτός πατάτας προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια, στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

Όσον αφορά τις ποικιλίες και υβρίδια προτιμούνται όσα παραπάνω αναφέραμε χωρίς να αποκλείονται λόγω του μεγάλου αριθμού των και άλλες ποικιλίες και υβρίδια, που θα υποδεικνύει η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης, εφόσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίμηση τους στις τοπικές συνθήκες και εφόσον ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

IV. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ**A. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ****α) Κομμένα λουλούδια**

Γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ζέρμπερες, στρελνίτζιες, ορχιδέες, βολβοειδή, κ.τ.λ.

β) Κομμένα φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλλωμάτων

γ) Γλαστρικά

Γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος, κ.τ.λ.

δ) Πολλαπλασιαστικό υλικό**B. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ**

Σε τοποθεσίες του νομού με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας) από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο.

α) Κομμένα λουλούδια: Γαρύφαλλα, βολβοειδή, κτλ

β) Κομμένα φυλλώματα: Όλα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλλωμάτων

γ) Γλαστρικά: Γαρδένια, καμέλια, κτλ.

δ) Φυτά κηποτεχνίας: Όλα τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον του νομού.

Υ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται:

α) Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους σε όλες τις κατάλληλες περιοχές του νομού και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

β) Ο εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός των υπάρχοντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήματα άρδευσης πάσης φύσεως, μηχανήματα και συστήματα για την φυτοπροστασία, συστήματα αφαλάτωσης νερού και άλλα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπ. Γεωργίας.

γ) Τα συστήματα εκμετάλλευσης θερμικών απωλειών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Για την καλλιέργεια του σπαραγγιού προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας:

- πολλαπλασιαστικό υλικό
- έγγειες βελτιώσεις
- συστήματα άρδευσης
- μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια σπαραγγιού
- συστήματα άρδευσης για πρωίμηση της παραγωγής.

3. Για τις καλλιέργειες μανιταριών προωθείται η εγκατάσταση, εκσυγχρονισμός και λειτουργία μονάδων παραγωγής μανιταριών οικογενειακής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη Γεωργική εκμετάλλευση θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

4. Για την καλλιέργεια της ανοιξιότικης πατάτας προωθείται η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας στις πρώιμες περιοχές του νομού.

5. Προωθούνται οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων - ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη.

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ**Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ****Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ**

Χρησιμοποιούμενο βασικό υποκείμενο η Νεραντζιά αλλά και οποιαδήποτε από α) Τρίφυλλη Πορτοκαλιά (*Poncirus trifoliata*), β) Troyer citrange, γ) Carrizo citrange και δ) Citmelo για τα γλυκόχυμα εσπεριδοειδή γενικά και μετά από έλεγχο του ασβεστίου στο έδαφος, ώστε το μεν ολικό να μην ξεπερνά το 20%, το δε ενεργό το 4% για την τρίφυλλη πορτοκαλιά και το 7% για τα υπόλοιπα. Ομοίως για τη λεμονιά, τη νερατζιά αλλά και τη C. Volkameriana και η C. Macrophylla γενικά. Για μετατροπές (επανεμβολιασμό, εκρίζωση και επαναφύτευση) φυτειών εσπεριδοειδών αποθάρρυνα μενων -ως εμπορικά ανεπιθύμητων- ποικιλιών, στις εσπεριδοπαραγωγικές περιοχές του νομού προωθούνται κατ' είδος οι παρακάτω ποικιλίες/ κλώνοι:

1. Πορτοκαλιά

α) Οι πρώιμες ποικιλίες Navel New Hall, Navelina και Salustiana

β) Η όψιμη ποικιλία Lane Late επί των υποκειμένων:

- τρίφυλλη πορτοκαλιά και Citranges για συγκομιδή της παραγωγής τον Φεβρουάριο μήνα,
- νερατζιά για συγκομιδή της παραγωγής τον μήνα Μάρτιο,
- C. Volkameriana για συγκομιδή της παραγωγής τους μήνες Απρίλιο και Μάιο,
- C. Macrophylla για συγκομιδή της παραγωγής τον μήνα Ιούνιο και μετά.

2. Λεμονιά

α) Η ποικιλία Αδαμοπούλου σε όλες τις ζώνες λεμονοκαλλιέργειας του νομού απηλλαγμένων παγετών για την αύξηση της εκτός συνήθους εποχής παραγωγής λεμονιών (θερινά λεμόνια) με την διαφοροποίηση των καλλιεργητικών εργασιών και φροντίδων (υδατική καταπόνηση, κτλ)

β) Η πολύμορφη ποικιλία Eureka μόνο επί του υποκειμένου Benton Citrange σε μη παγετόπληκτες περιοχές, που είναι αμόλυντες από την ασθένεια «Κορυφοξήρα».

3. Μανταρινοειδή

α) Η Κλημεντίνη και ιδιαίτερα οι κλώνοι της Marisol, Clemenpons, Arrufantina, Sra 63, Πόρου και το μανταρινοειδές Nova στις κατάλληλες περιοχές του νομού.

β) Η μεσο-όψιμη Κλημεντίνη Hernandezina στις απαλλαγμένες παγετού κατάλληλες περιοχές του νομού

γ) Τα μανταρινοειδή Fortune και Ortanique με προτίμηση τον κλώνο Mandoras στις απαλλαγμένες παγετού κατάλληλες περιοχές του νομού

Β. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ**1. Πεκάν**

Με τις ποικιλίες Pawne, Choctaw, Western, Desirable και Delmas (η ανωτέρω καλλιέργεια αντέχει και σε μη θερμά κλίματα).

Γ. ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Μόνο σε περιοχές του νομού όπου δεν έχουν εμφανιστεί προσβολές από βακτηριακό κάψιμο σε μηλοειδή ή φυτά ξενιστές της αυτοφυούς βλάστησης.

1. Μηλιά

α) Από την ομάδα Red Delicious οι κλώνοι Topred, Red-Chief, Oregon Spur και Starkrimson (τύπος Spur)

β) Από την ομάδα Golden Delicious οι κλώνοι Smoothee, Golden B.

γ) Από τις τριπλοειδείς ποικιλίες, οι ποικιλίες Jonagold, Jonagored με την πρόβλεψη να μπουν απαραίτητα δύο διπλοειδείς ποικιλίες για κανονική γονιμοποίηση.

δ) Από τις πρώιμες ποικιλίες η ποικιλία Gala και ειδικά οι κόκκινες μεταλλαγές της.

ε) Από τις ανθεκτικές στο φουζικλάδιο ποικιλίες η Florina (Guérina) ενδείκνυται κυρίως για ορεινές και υγρές περιοχές.

Όλες οι ποικιλίες που αναφέρονται παραπάνω φυτεύονται σε πυκνή φύτευση στα υποκείμενα M9, M26, MM 111 και MM 106 στις ορεινές περιοχές του νομού. Οι κλώνοι τύπου Spur εμβολιάζονται μόνο στα ημινάνα υποκείμενα MM106, MM111 εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπου δημιουργούνται προβλήματα καλής στήριξης των δένδρων από χιονοπτώσεις, οπότε κρίνεται σκόπιμη και η χρησιμοποίηση σποροφυτών.

2. Αχλαδιά

Οι νέες ποικιλίες Συριαννίδη 1/6, Αμαλθία (Συριαννίδη 1/7), Καλλιόπη (Συριαννίδη 7/9), Βεργίνα (Συριαννίδη 2/9), οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες. Προωθούνται σε περιοχές κυρίως πεδινές κατάλληλες για την καλλιέργεια της αχλαδιάς και εφόσον η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας κρίνει, ότι μπορεί να εντάξει την καλλιέργεια της αχλαδιάς στα τοπικά γεωργικά προγράμματα της.

Δ. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ**1. Βερυκοκιά**

Η ποικιλία Πρωίμο Τίρυνθος στις κατάλληλες περιοχές του νομού και Μπέμπεκογ σε ξηροθερμικές περιοχές και περιοχές με περιορισμένες βροχοπτώσεις.

2. Ροδακινιά

Προωθείται μόνο σε περιοχές, όπου παράγεται προϊόν που έχει εγκριθεί ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) 2081/1992.

Ε. ΑΚΡΟΔΡΥΑ**1. Καρυδιά**

Βασικά οι ποικιλίες:

- GUSTINE (πλαγιόκλαδη, πρώιμης βλάστησης) με επικονιαστή είτε την AMIGO είτε την PEDRO.
- VINA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους ως ανωτέρω επικονιαστές.
- CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.
- HARTLEY (με πολύ μικρή πλαγιόκαρπια, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή την FRANQUETTE.

- **FRANQUETTE** (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) και με επικονιαστές είτε την **RONDE DE MONTIGNAC** ή την **MEYLANNAISE**. Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%.

2. Καστανιά

Κάθε ποικιλία, η οποία κρίνεται από την αρμόδια Δ/νση Γεωργίας σαν κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής και δεν παρουσιάζει πρόβλημα προσβολής από τον μύκητα **ENDOTHIA PARASITICA**.

ΣΤ. ΕΛΙΑ

Επεκτείνονται νέες φυτεύσεις ελαιοδένδρων σε έκταση 300στρ. στο νομό σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 342155/16.03.2000 εγκυκλίου της Δ/νσης ΠΑΠ Δεν/κης του Υπ. Γεωργίας.

Ζ. ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1. Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα

Οι ποικιλίες των ειδών **IDAEUS OCCIDENTALIS** & **URSINUS FRUTICOSUS** και **VACCINIUM CORYMBOSUM** καθώς και οι υβριδικές μορφές τους στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού.

II. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Στα αμπελοειδή προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες στο νομό, οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν. (ΕΟΚ) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του, καθώς επίσης και οι επιτρεπόμενες εκείνες, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης Τοπικών οίνων. Σημειώνεται, ότι επέκταση της καλλιέργειας επιτρέπεται μόνο κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς (ΕΚ) και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.

III. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες αυτών:

1. Τομάτα υπό κάλυψη

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική αγορά. Από αυτά προτιμούνται τα παρακάτω υβρίδια και ποικιλίες: **CORTINA**, **ERNESTO**, **NAESICA**, **IRON**, **INDALO**, **BIZON-F1-1255**, **JAMBO-F1**, **MANTHOS**, **NOA**, κ.τ.λ.

2. Αγγούρι υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια, που έχουν δοκιμαστεί και ευδοκίμουν στο νομό όπως τα **CADOR**, **VENUS**, **VIGINIA 722**, **BAMBINA**, **SANDRA**, κ.τ.λ.

3. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονοειδών, φασολάκια και κολοκυθιών.

4. Φράουλα υπό κάλυψη

Οι ποικιλίες **USO GRANDE**, **DOUGLAS**, κ.τ.λ.

5. Τομάτα στην ύπαιθρο

Οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη και οι ποικιλίες **ERATO FI**, **CORBI FI**, **GALLI**, κτλ, εφόσον εφαρμόζεται ειδικά καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή την οψίμηση της παραγωγής.

6. Σπαράγγια στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις κατάλληλες προσφερόμενες για τον σκοπό αυτό αμώδεις περιοχές του νομού.

7. Φράουλα στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες φράουλας και ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση φράουλας υπό κάλυψη στις κατάλληλες προσφερόμενες περιοχές του νομού.

8. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση

Τα είδη αγγινάρα, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, μπάμια και αγγουράκι στις κατάλληλες περιοχές του νομού.

9. Μανιτάρια

Τα καλλιεργούμενα μανιτάρια βασιδιομυκήτων των ειδών **AGARICUS BISPOROUS**, **AGARICUS BITOROUS**, **PLEUROTUS SP** κ.τ.λ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας και η οποία αφορά α) την καταλληλότητα του φορέα και β) την καταλληλότητα της προσφερόμενης τοποθεσίας που πρόκειται να γίνει η καλλιέργεια.

10. Γενικά

Για όλα τα κηπευτικά εκτός της πατάτας προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια, στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

IV. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

A. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

α) Κομμένα λουλούδια

Γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ζέρμπερες, στρελίτζιες, ορχιδέες, βολβοειδή, κ.τ.λ.

β) Κομμένα φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλλωμάτων

γ) Γλαστρικά

Γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος, κ.τ.λ.

δ) Πολλαπλασιαστικό υλικό

B. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Σε τοποθεσίες του νομού με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας) από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο.

α) Κομμένα λουλούδια: Γαρύφαλλα, βολβοειδή, κτλ

β) Κομμένα φυλλώματα: Όλα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλλωμάτων

γ) Γλαστρικά: Γαρδένια, Καμέλια, κτλ.

δ) Φυτά κηποτεχνίας: Όλα τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον του νομού.

V. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται:

α) Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους σε όλες τις κατάλληλες περιοχές του νομού και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

β) Ο εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήματα άρδευσης πάσης φύσεως, μηχανήματα και συστήματα για την φυτοπροστασία, συστήματα αφαλάτωσης νερού και άλλα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπ. Γεωργίας.

γ) Τα συστήματα εκμετάλλευσης θερμικών απωλειών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Για την καλλιέργεια του σπαραγγιού προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας:

- πολλαπλασιαστικό υλικό
- έγγειες βελτιώσεις
- συστήματα άρδευσης
- μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια σπαραγγιού
- συστήματα άρδευσης για πρωίμηση της παραγωγής.

3. Για τις καλλιέργειες μανιταριών προωθείται η εγκατάσταση, εκσυγχρονισμός και λειτουργία μονάδων παραγωγής μανιταριών οικογενειακής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη Γεωργική εκμετάλλευση θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

4. Για την καλλιέργεια της ανοιξιότικης πατάτας προωθείται η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας στις πρώιμες περιοχές του νομού.

5. Προωθούνται οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων - ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 22 Ιουνίου 2000

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δ.Γ.Α.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ